



ANSM - Mis à jour le : 30/09/2025

Dénomination du médicament

HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème
Polyester sulfurique de pentosane

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?
3. Comment utiliser HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : PRODUIT LOCAL POUR LES DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES.

Ce médicament est préconisé en traitement local d'appoint des traumatismes bénins (bleus, coups) chez l'adulte et l'enfant à partir d'un an.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

N'utilisez jamais HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème dans les cas suivants :

- Antécédents d'allergie ou de baisse du nombre de plaquettes dans le sang suite à la prise d'un traitement anticoagulant par héparines ou par des produits apparentés à l'héparine.
- Allergie connue (hypersensibilité) aux autres constituants (parahydroxybenzoate de méthyle et propylèneglycol).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème.

Pour usage externe exclusivement. Ne pas avaler.

- Ce médicament contient du propylèneglycol et peut provoquer des irritations de la peau.
- Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques.
- Arrêter le traitement en cas de réactions allergiques cutanées.
- Ne pas appliquer au voisinage immédiat des yeux, sur les muqueuses, sur les plaies, sur les brûlures, sur les lésions infectées ou les maladies de la peau suintantes.
- Bien se laver les mains après chaque utilisation (afin d'éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses).

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème contient du propylèneglycol (E1520), et du parahydroxybenzoate de méthyle (E218)

3. COMMENT UTILISER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

Posologie

Appliquer 2 à 4 fois par jour sur la région à traiter en massant très légèrement pour faciliter la pénétration.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée. Application locale.

Si vous avez utilisé plus de HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème que vous n'auriez dû

Une utilisation excessive pourra entraîner une aggravation des effets indésirables, notamment l'irritation cutanée.

Si vous oubliez d'utiliser HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Possibilité de réactions allergiques localisées au point d'application.

Ce médicament contient 5 g de propylène glycol pour 100 g de crème. Le propylène glycol peut causer une irritation cutanée.

Ce médicament contient 150 mg parahydroxybenzoate de méthyle pour 100 g de crème. Le parahydroxybenzoate de méthyle peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème

- La(les) substance(s) active(s) est (sont) :

Polyester sulfurique de pentosane
0,500 g

Pour 100 g de crème.

- Les autres composants sont :

Cire émulsionnante non ionique au cétostéaromacrogol, huile de maïs polyglycolysée, glycérol, propylèneglycol (E1520), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), acide lévulinique, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de crème. Tube de 30 g.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

196 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY

OU

UNITHER LIQUID MANUFACTURING

1-3 ALLEE DE LA NESTE
31770 COLOMIERS

ou

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

2 Rue DE LA SAUSSAIE
77310 SAINT-FARGEAU PONTIERRY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin :

Si vous avez besoin d'information ou de conseils supplémentaires.

Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce médicament est bien adapté à votre cas, en particulier :

- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez ;
- Si vous avez, en dehors de ce que vous voulez traiter par ce médicament, une autre maladie ;
- Si vous prenez d'autres médicaments en même temps, même s'ils sont vendus sans ordonnance ;
- Si vous avez déjà été allergique à un médicament.

Conseils de prévention à associer

Les accidents pourraient être évités par des mesures de prévention adaptées :

- Aménagez votre maison pour éviter les risques de chutes,
- Portez des équipements de protection adaptés lors de diverses activités (bricolage, activités sportives : gants, casque, protège-tibia, genouillères, chevillères, etc).

Signes d'alerte, nécessitant une consultation médicale

N'essayez pas de vous prendre en charge vous-même si :

- les douleurs sont violentes, étendues ou entraînent un arrêt de l'activité,
- il est impossible de marcher ou de se servir du membre atteint,
- la zone blessée devient rouge, chaude et douloureuse,
- il semble qu'une poche liquide se soit formée,
- le choc a touché l'œil ou la proximité de l'œil,
- les signes sont apparus sans cause évidente, en absence d'un choc,
- vos signes persistent ou s'aggravent.

Ces signes peuvent être les symptômes d'une maladie/situation plus grave, pour laquelle un avis médical s'impose.